

COMPOMIX SMC

Supplément nutritionnel pour bovins, ovins, caprins et porcins

OBJECTIFS NUTRITIONNELS
Sevrage, phases critiques de croissance

COMPOSITION
Sorbitol, chlorure de choline, méthionine, amidon de blé (7%), silice, arôme.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

Cendres brutes..... 13 %
Humidité..... 7 %
Protéines brutes ..... 19 %

ADDITIFS au KG

Acides aminés :
DL Méthionine .....150 g
Choline (sous forme de chlorure) .130 g

Autres additifs :
Sorbitol.....400 g

CONSERVATION
Tenir à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
Durée de conservation : 18 mois

PRESENTATIONS
Sac de 10 kg ACL 638432.6
Sac de 25 kg ACL 729668.2

CATEGORIE
Supplément nutritionnel

Fabricant : α FR 61006114

PROPRIETES

COMPOMIX SMC permet de corriger les déséquilibres des rations alimentaires chez les bovins, ovins, caprins et porcins. Il est à utiliser lors de rations déséquilibrée ou de mauvaise qualité (mauvais foin, ensilage mal conservé, céréales chauffées ou germées, matières premières à taux d'acidité ou d'alcool trop importants).

MODE D'EMPLOI

Administration par voie orale dans la ration ou le lait.

- *Chez les bovins :*

Bovins reproducteurs : 100 g par animal et par jour*, tous les mois pendant 3 à 5 jours*
Bovins à l'engrais : 50 g par animal et par jour, *tous les mois pendant 3 à 5 jours*
En distribution mensuelle.

- *Chez les ovins et caprins* :

Ovins et caprins reproducteurs : 20 g par animal et par jour *pendant 3 à 5 jours*
En distribution mensuelle pour les animaux en lactation.

- *Chez porcins* :

Porcs à l'engrais : 20 g par animal et par jour *pendant 3 à 5 jours*
Porcs reproducteurs : 30 g par animal et par jour *pendant 3 à 5 jours*

PRECAUTIONS D'EMPLOI
Bien mélanger à la ration lors de l'utilisation. Assurer une bonne transition alimentaire.

NOE
BP 50019
02407 CHIERRY CEDEX
Tél 03.23.84.80.00 - Fax : 03.23.83.06.70
e.mail : socopharm@noe.fr